

## معلومات الرعاية

## الرضاعة في أثناء اليقظة/النعاس

لا أرضع جيدًا	أنا مستعد للرضاعة	
لا يستيقظ الطفل بمفرده للرضاعة كل 3 ساعات	يستيقظ الطفل بمفرده كل ساعتين أو 3 ساعات	قبل الرضاعة
المص غير النشط:	المص النشط: • يرضع لمدة 10 دقائق على الأقل • المص المتواصل حتى 8 إلى 10 مصات أو أكثر تعقبها بلعة • قد يتوقف الطفل لمدة تتراوح بين 5 و10 ثوان • يمكن استخدام اليد للضغط على الثدي • يمكن استخدام طريقة تدليك الطفل للتحفيز	المص
ע	نعم	هل حركة الفكين واسعة؟
צ	نعم	هل تسمعين صوت بلع؟
نعم	У	هل تشعرين بألم في الحلمة؟
إذا ظهرت هذه العلامات، فتوقفي عن الرضاعة الطبيعية واستخدمي مضخة الثدي، ثم أرضعي طفلكِ حليب ثدي/حليبًا صناعيًا باستخدام زجاجة الرضاعة. وجربي الرضاعة الطبيعية في المرة القادمة.	إذا ظهرت هذه العلامات، فأرضعي الطفل من أحد الثديين لمدة 20 دقيقة ثم اجعليه يتجشأ، ثم قدمي له الثدي الأخر.	التوجيهات:
<ul> <li>الحلمة ملتوية أو مجعدة</li> <li>الطفل مستاء</li> <li>الثدي ما زال ممتلئًا</li> <li>كمية الحليب الناتجة عن مضخة الثدي لم تتغير كما لو أنه لم يرضع طبيعيًا</li> </ul>	<ul> <li>الحلمة أكثر طولًا ومستديرة</li> <li>الطفل سعيد</li> <li>الثدي لتن</li> <li>كمية الحليب الناتجة عن مضخة الثدي أقل بعد</li> <li>الرضاعة الطبيعية</li> </ul>	بعد الرضاعة
<ul> <li>أقل من 6 إلى 8 حفاضات شديدة الابتلال</li> <li>أقل من 3 حفاضات بها براز بلون أصفر/أصفر فاقع</li> <li>اتصلي بطبيب طفلكِ</li> <li>استخدمي الرضاعة بالزجاجة والرضاعة الطبيعية</li> </ul>	<ul> <li>على الأقل من 6 إلى 8 حفاضات شديدة الابتلال</li> <li>على الأقل 3 حفاضات بها براز بلون أصفر فاقع</li> </ul>	يوميًا

• اطلبي من استشاري الرضاعة الطبيعية مساعدتكِ فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية في أثناء فترة مكوثكِ في المستشفى. يمكنه مساعدتكِ وإسداء النصائح بشأن طرق إيقاظ طفاكِ، والتقام الثدي، واستخدام مضحة الثدي.

10/2023





